

بسم الله الرحمن الرحيم

عوارض زخم جراحی، مسائل جدار شکم و عفونت زخم

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا
دانشیار



عوارض زخم

۱. زودرس (تا ۳۰ روز)

- سروما
- هماتوم
- عفونت سطحی

← عوارض غیرجدی

- عفونت عمقی
- Dehiscence
- Evisceration

عوارض
جدی

← در صورت بروز

← افزایش عوارض و مرگ و میر

□ تقریبا ریشه تمام عوارض جدی، جدی نگرفتن عوارض غیر جدیست.

□ یکی از گناهان کبیره کوچک شمردن

۲. دیررس

عفونت زخم

(1) عفونت معمول

(2) عفونت غیر معمول : باید به فکر مسائل جدی تر بود.

عفونت معمول زخم

■ شک

1. درد غیر معمول +/-

2. تب +/-

3. تورم و سفنی +/-

4. گرمی و قرمزی +/-


5. خروج ترشح از زخم +/-

زخم Mature ← فیزیولوژیک

زخم Immature ← پاتولوژیک

تشخیص

بالینی است.



• نقش آزمایشگاه و سونوگرافی و ...

درمان

□ درناژ +/- آنتی بیوتیک

■ پیشگیری

(۱) عام

(۲) خاص

(a) آنتی بیوتیک پروفیلاکسی (کلاس ۲ و ۳ و گاهی ۱ و ۴)

(b) باز گذاشتن زخم و شستشوی روزانه (کلاس ۴)

عفونت غیر معمول زخم

• در این موارد باید به عفونت غیر معمول شک کرد.

1. عدم پاسخ به درمان معمول

2. وجود Dehiscence و Evisceration


3. بوی بیهوازی

4. خروج صفرا، مدفوع و ... از زخم

□ در این موارد باید به آبسه شکمی، پریتونیت و فیستول، جسم خارجی و ... شک کرد.

فیستول

- تعریف: ارتباط غیرطبیعی بین دو سطح اپیتلیال



- تشخیص

درمان

- داخلی ← اگر نیاز به درمان باشد ← جراحی
- خارجی ← طبی (اصلاح آب و الکترولیت و تغذیه / صبر و انتظار ۸۰٪ جواب می دهد)

جراحی (۲۰٪) نیاز پیدا می کند



آبسه

جسم خارجی

End fistula

....

□ جراحی در فیستول هیچگاه اورژانسی نیست.



موفق باشيد